Pengendalian Hama Kepik *Anoplocnemis phasiana* Fabricius (*Hemiptera : Coreidae*) Pada Tanaman Flori Polcyas



Gambar : Kepik Anoplocnemis phasiana (a), gejala serangan pada tangkai bunga (b), gejala serangan pada pucuk (c)

Panjang tubuh serangga tersebut sekitar18–27 mm, berwarna coklat tua. Bersifat omnivora dan mengalami metamorfosa tidak sempurna, dan mengalami pergantian kulit berkali-kali. Kepik tersebut merusak tanaman dengan cara mengisap cairan pada jaringan tanaman, sehingga menyebabkan jaringan tanaman tersebut rusak dan mengering.

Gejala Serangan

Kepik dewasa dan nimfa memakan daun tanaman terutama daun muda, menyebabkan gejala bercak nekrotik pada daun, kalau menyerang ranting muda maka ranting akan mati.

Sumber Serangan dan Cara Penyebaran

Terbawa oleh benih dan tanaman lain di sekitar pertanaman

Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Populasi

Keberadaan inang lain terutama tanaman mangkokan dan tanaman lain dari famili Leguminase dan Convolvulaceae di sekitar pertanaman Polyscias.

Sumber : - Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura – Direktorat Jenderal Hortikultura
- Institut Pertanian Bogor