
# Pengendalian Hama Pengisap Daun Tungau Merah pada Tanaman Kacang Tanah



Tungau merah Tetranychus cinnabarius (Sumber: Ecoport.org).

Tungau Merah *Tetranychus cinnabarius* Boisduval Acarina: Tetranycidae Bioekologi. Tubuh tungau berwarna merah dengan tungkai putih. Panjang tubuhnya sekitar 0,5 mm. Perkembangan dari telur hingga menjadi tungau dewasa berlangsung selama lebih kurang 15 hari. Telur diletakkan di permukaan bawah daun kacang tanah. Warna telur kuning pucat dan berbentuk bulat dengan ukuran 0,15 mm. Pada musim kering, perkembangbiakkan populasi tungau sangat cepat. Tungau menyerang tanaman dengan mengisap cairan daun sehingga daun berwarna kekuning-kuningan. Pada daun yang terserang akan dijumpai jaringan benang halus yang digunakan oleh tungau dewasa untuk berpindah ke daun lain yang masih segar dengan cara bergantung pada benang. Selain kacang tanah, tungau merah juga menyerang, kacang hijau, kacang tunggak, kacang panjang, ubikayu, pepaya dan karet.

**Pengendalian**

- Tanam serempak.
- Pemantauan secara rutin apabila populasi tinggi semprot dengan Akarisida.

*Sumber: Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*